

TERMESZTÉSI ÚTMUTATÓ

SÜNGOMBA TERMŐBLOKK



www.gombajo.hu

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Termesztési körülmények:

- **Hőmérséklet:** 14-18 °C fok
- **Páratartalom:** 70-80%
- **Szellőztetés:** levegőcsere biztosítása, huzat mentesen
- **Fényigény:** van

A süngomba termesztéséhez fény szükséges. Természetes szórt fény, vagy mesterséges fény is megfelelő. Napi 8-10 órában annyi fényt igényel, melynél akár olvasni is lehet. A zsákot azonban semmiképpen ne helyezzük napra, mert kiszárad!

Alkalmas termeszto helyiség: garázs, tároló, vízóra akna, pince, ill. egyéb olyan helyiség, ahol a fenti feltételek biztosíthatóak.

1. LÉPÉS: TERMŐBLOKK ELŐKÉSZÍTÉS

A süngomba termőblokkot átszövetett, termesztésre készen adjuk át. **1**
A termőblokkot tartsuk addig magasabb hőmérsékleten, 18-20 °C fokon, amíg az alapanyag teljes felületét fehér gombafonalak borítják. Ekkor a kifehéredett termőblokkokat tiszta kézzel, a letermesztésre szánt, tiszta, fertőzésmentes helyiségbe (14-18 °C) helyezzük, ahol fenti termesztési körülmények biztosíthatóak. Letehetjük akár közvetlenül a talajra is, tiszta padozatra. Polcokon, vagy felfüggesztett megoldással is termeszthető. A termőblokkot hagyjuk a fóliában! Késsel 2-3 helyen vágjunk rajta 1-2 cm-es réseket. A blokk tetején található kupakot (piros redős csövet) a blokk tetejéig húzzuk vissza és ott ugyanúgy köss **2** vissza. A vattapapírt rajtahagyjuk, a legtetején található zsírpapírt pedig eltávolítjuk.



2. LÉPÉS: TERMESZTÉS

Az első szüret a dugó lehúzásától számított 1,5-2 hét múlva várható. Ott, ahol a fólia alatt gombakezdeményeket lát, a fóliát ugyancsak fel kell nyitni kb. 1 cm-es vágással. 5 nyílásnál többet azonban ne vágjunk a blokkon, hogy ki ne száradjon.

Öntözés: A süngomba termőblokk öntözést nem igényel!

Szellőztetés: Biztosítsuk a levegőcserét, de fontos figyelni arra, hogy nem lehet huzat! A gombáknak nincsen párologtatást szabályozó szerve. Így huzatban folyamatosan vizet vesztenek és kiszáradnak. Általános visszajelzés, hogy ha belépve a termesztohelyiségbe nem nehéz vagy áporodott a levegő, akkor a levegőzés rendben van.

Páratartalom: A páratartalom biztosítására ajánlott a termőblokk környezetét folyamatosan permetezni, öntözni, nedvesen tartani, vagy párástó berendezést használni. Ez biztosít elegendő párárt a gombáknak. Ha nincsen erre szolgáló mérőműszerünk és úgy érezzük nem elég a pára, készítsünk mikroklímát a következő megoldással: Tegyük a termőblokk fölé kb. 40-50 cm magasságba egy harang alakú, pár helyen kilyukasztott fóliát. A fólia alját a talajtól 3-4 cm-re gyűrjük föl, hogy a szén-dioxid távozhasson.



Fény: A termőre forduláshoz és a termesztés folyamán napi 8-12 órában biztosítsuk a fényigényét! Ha nincs természetes fény, akár egy izzó is megfelel.

3. LÉPÉS: SZÜRETELÉS

A süngomba növekedése akár 2 hétig is eltarthat. A teljesen érett süngomba hófehér, közepesen kemény állagú. Öregedését sárgásbarna elszíneződése jelzi. Ezért sárgulás előtt érdemes leszüretelni. A süngombát egy éles késsel a termőblokk felszínén vágjuk le. Tönk maradvány ne maradjon a termőblokkon! Amennyiben mégis maradna, a tönkcsontot a blokkig teljesen vágjuk vissza! Így megakadályozható a kultúra elfertőződése. A friss süngomba hűtőszekrényben tárolva tetszetős fehér színét még 2-3 napig megőrzi, de akár 1 hétig is eláll és biztonsággal fogyasztható. Lehetséges a gombákat kiszárítani is, könnyen száradnak.

Egy termőblokkról kb. 3-4 hónap alatt, elnyújtott 2-3 hullámban összesen kb. 0,8-1,5 kg süngomba szüretelhető. Az egészséges süngomba termőblokk 3-4 hónapig termőképes, majd ezt követően merül ki. De egyes esetekben van, amikor még később is terem. Addig érdemes termesztésben tartani, amíg még terem és be nem zöldül a termőblokk. A letermett termőblokk lepuhul, elszíneződik, térfogata összeesik.



♻ Ezután a letermett alapanyag igény szerint felhasználható kerti trágyaként. A letermett gombakomposzt értékes és természetes kerti trágya!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a várható terméshozam nem automatikus és nem garantálható! A gombakultúra egy élő kultúra, melynek terméshozama függ a termesztési körülményektől (hőmérséklet, páratartalom, szellőztetés, higiénia) és a termesztés alatti gondosságtól (emberi tényező). Javasolt odafigyeléssel termesztetni, nézni hogyan reagál és változtatni ha szükséges! A termesztés paramétereit kezeljük szoros összefüggésben. Például magasabb termesztési hőmérséklet esetén a levegőcsere legyen nagyobb és ehhez állítsuk a páratartalmat is.

Mit tegyek, ha ...?

... nem akarom még beindítani a termesztést? A termőblokk, amin még nem jelentek meg a gombák, 10-12 fok körüli sötét helyiségben, vagy hűtőszekrényben 2-3 hétig még eltartható. Ha már ilyen körülmények között is elkezdenek kibújni a gombák, akkor a termőblokkot kezdjük el letermeszteni.

... a termesztő helyiségben kis muslica szerű szúnyogok jelentek meg? Minden gombakultúrában termesztés folyamán előfordulhatnak kártevők, ilyen a gombaszúnyog, mely leginkább túl magas hőmérsékleten szaporodhat el, főként nyáron és ősszel. Ez ellen elektromos rovarcsapdával, vagy sárga színű ragacsos légyapírral védekezhetünk, melyet vásárolhatunk gazdaboltban, kertcentrumokban. A légyapírt este, amikor más fényforrás nincs, megvilágítva, jobb hatásfokra számíthatunk.

... zöldpenész jelenik meg a termőblokkon? Addig amíg még terem és kemény a termőblokk, addig lehet termesztetni. Ha a termőblokk megpuhul, már nem fog teremni, távolítsuk el a termesztő helyiségből.

...lesárgul a gomba? Nagy huzat esetén a gombák besárgulnak és felszínük leszárad. Csökkentsük a huzatot!

A GOMBATERMESZTÉSHEZ SIKERES MUNKÁT ÉS JÓ TERMÉST KÍVÁNUNK!